

——— 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。 ———

「使用上の注意」改訂のお知らせ

アドレナリン α_2 受容体作動薬
緑内障・高眼圧症治療剤

処方箋医薬品^{注)}

アイファガン[®]点眼液0.1%
AIPHAGAN[®] OPHTHALMIC SOLUTION 0.1%
ブリモニジン酒石酸塩点眼液

注) 注意—医師等の処方箋により使用すること

このたび、当社製品「アイファガン[®]点眼液0.1%」につきまして、「使用上の注意」を下記のように自主改訂いたしましたので、謹んでご案内申し上げます。

なお、流通在庫の関係から改訂添付文書を封入した製品が、お手元に届くまでには若干の日数が必要かと思われまますので、本製品のご使用に際しては、ここにご案内いたしました改訂内容をご覧くださいますようお願い申し上げます。

製造販売元：千寿製薬株式会社

【使用上の注意】の改訂内容

改訂後（下線部追加）				改訂前			
4. 副作用				4. 副作用			
	頻度不明	5%以上	0.1~5%未満		頻度不明	5%以上	0.1~5%未満
過敏症	発疹、紅斑、蕁麻疹		接触性皮膚炎、 丘疹	過敏症	発疹、紅斑、蕁麻疹		接触性皮膚炎、 丘疹
眼	眼瞼障害、麦粒腫、角膜炎、角膜びらん、虹彩炎、白内障、硝子体剥離、硝子体浮遊物、視野欠損、視力低下、縮瞳、灼熱感、羞明、 <u>角膜混濁</u>	(略)	(略)	眼	眼瞼障害、麦粒腫、角膜炎、角膜びらん、虹彩炎、白内障、硝子体剥離、硝子体浮遊物、視野欠損、視力低下、縮瞳、灼熱感、羞明	(略)	(略)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)

<改訂理由>

販売開始以降、本剤との因果関係が否定できない「角膜混濁」の症例が集積されたため、「角膜混濁」を副作用欄に追記し、注意喚起することとしました。

医薬品添付文書改訂情報は独立行政法人医薬品医療機器総合機構のホームページに、最新添付文書並びに医薬品安全対策情報（DSU：Drug Safety Update）が掲載されます。あわせてご利用ください。

問い合わせ先：千寿製薬株式会社 カスタマーサポート室
〒541-0048 大阪市中央区瓦町三丁目1番9号
TEL 0120-069-618 FAX 06-6201-0577
受付時間 9:00～17:30（土、日、祝日を除く）