

お得意様各位

表示変更のご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は、弊社製品につきまして格別のご愛用を賜り有難く厚くお礼申し上げます。

さて、このたびセフェム系抗生物質製剤「ベストロン®点眼用0.5%」につきまして、以下のとおり投薬袋の表示の変更を行いますので、謹んでご案内申し上げます。

なお、変更後の製品がお手元に届くまで若干の日数を要することがありますので、ご了承いただきますようお願い申し上げます。

敬具

処方せん医薬品

ベストロン®点眼用0.5%

変更内容

投薬袋の表面の保存に関する表現を簡略化します。また、誤使用防止のため、裏面の「点眼の際にはピンクの小キャップだけをとりはずす」旨の表示内容を表面に移し、強調します。

(裏面をご参照ください)

本表示変更と同時に、「使用上の注意」の自主改訂等を行います。「使用上の注意」の改訂等の内容につきましては、別途ご案内致します“「添付文書」改訂のお知らせ”をご参照ください。

※JANコード、統一商品コードおよび薬価基準収載医薬品コードは変更ありません。

変更表示

- 個装箱蓋部および使用期限表示面に **表示変更品** を表示します。また、使用期限末尾にAを表示します。

変更対象

製品名	包装	製造番号	出荷予定時期
ベストロン点眼用0.5%	[25mg(力価)・溶解液 5mL]×5	粉末：A037 溶解液：A037	未定

千寿製薬株式会社

大阪市中央区平野町二丁目5番8号

投薬袋表示

	現 行 品	変 更 後
表面	<p>点 眼 薬</p> <p>_____さま</p> <p>1回_____滴</p> <p>右 眼 _____回</p> <p>1日 左 眼 _____回 点眼</p> <p>両 眼 _____回</p> <p>_____年 _____月 _____日</p> <p>病医院・薬局名 _____</p> <p>溶解日 _____月 _____日</p> <p>_____月 _____日まで使用可</p> <p>溶解後はこの袋に入れて、凍結を させて冷所に保存し、7日以内に ご使用ください。</p> <p>PE</p>	<p>点 _____さま</p> <p>1回_____滴</p> <p>右 眼 _____回</p> <p>1日 左 眼 _____回</p> <p>両 眼 _____回</p> <p>_____年 _____月 _____日</p> <p>病医院・薬局名 _____</p> <p>溶解日 _____月 _____日</p> <p>_____月 _____日まで使用可</p> <p>溶解後は冷所に保存。(凍結をさせ、 7日以内に使用)</p> <p>⚠️ ピンクの小キャップだけを とりはずし点眼してください。</p>
	<p>《下欄の記載内容》</p> <ul style="list-style-type: none"> 溶解後はこの袋に入れて、凍結をさせて冷所に保存し、7日以内にご使用ください。 	<p>《下欄の記載内容》</p> <ul style="list-style-type: none"> 溶解後は冷所に保存。(凍結をさせ、7日以内に使用) <u>ピンクの小キャップだけをとりはずし点眼してください。</u>
裏面	<p>点眼薬の調製法</p> <p>①粉末瓶の矢印(↑)の部分から親指で強く押し上げてください</p> <p>②溶解液瓶の大キャップをまわしてとりはずし、液がこぼれないように開封した粉末瓶にしっかりさし込み、よく振って粉末を完全に溶かしてください</p> <p>③溶解液瓶の方に薬液を移した後、粉末瓶をとりはずし、大キャップをし、固く締めてください</p> <p>④ピンクの小キャップだけをとりはずし、容器の先が目に触れないように、注意しながら点眼してください</p> <p>PE</p>	<p>点眼薬の調製法</p> <p>①粉末瓶の矢印(↑)の部分から親指で強く押し上げてください</p> <p>②溶解液瓶の白い大キャップをまわしてとりはずし、液がこぼれないように開封した粉末瓶にしっかりさし込み、よく振って粉末を完全に溶かしてください</p> <p>③溶解液瓶の方に薬液を移した後、粉末瓶をとりはずし、大キャップをし、固く締めてください</p> <p>PE</p>
	<p>《④の記載内容》</p> <p>ピンクの小キャップだけをとりはずし、容器の先が目に触れないように、注意しながら点眼してください。</p>	<p>(現行品の左記表現を削除)</p>