

お得意様各位

表示変更のご案内

(変更対象品の製造番号・出荷予定時期変更に伴う再案内)

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は、弊社製品につきまして格別のご愛用を賜り有難く厚くお礼申し上げます。

さて、このたび老人性白内障治療剤「カタリン®点眼用0.005%」および「カタリン®K点眼用0.005%」につきまして、以下のとおり表示の変更を行いますので、謹んでご案内申し上げます。

なお、変更後の製品がお手元に届くまで若干の日数を要することがありますので、ご了承いただきますようお願い申し上げます。

敬具

カタリン®点眼用0.005% カタリン®K点眼用0.005%

変更内容

- ・内箱の使用期限に関する表示を、以下の通り、変更します。

＜カタリン点眼用0.005%＞

「錠剤を溶解するまでの使用期限」から「使用期限（錠剤を溶解するまで）」に変更し、注記として「錠剤溶解後は3週間以内にご使用ください。」を追記します。

＜カタリンK点眼用0.005%＞

「顆粒を溶解するまでの使用期限」から「使用期限（顆粒を溶解するまで）」に変更し、注記として「顆粒溶解後は3週間以内にご使用ください。」を追記します。

- ・内箱の「点眼される際のお願い」について、表示内容を変更します。

(裏面をご参照ください)

本表示変更と同時に、「使用上の注意」の自主改訂を行いました。「使用上の注意」の改訂内容につきましては、別途ご案内致しました「「使用上の注意」改訂のお知らせ」をご参照ください。

※JANコード、統一商品コードおよび薬価基準収載医薬品コードは変更ありません。

変更表示

- ・個装箱蓋部および使用期限表示面に「表示変更品」を表示します。また、使用期限末尾にAを表示します。

変更対象



製品名	包装	製造番号	出荷予定時期
カタリン点眼用 0.005%	15mL×10	錠剤:R067 溶解液:A067	2011年4月
	15mL×50	錠剤:R068 溶解液:A068	2011年5月
カタリンK点眼用 0.005%	15mL×10	顆粒:R290 溶解液:A281	2011年3月
	15mL×50	顆粒:R287 溶解液:A278	2011年4月

※出荷予定時期は諸事情により変更になることがあります。

千寿製薬株式会社

大阪市中央区平野町二丁目5番8号

内箱表示(カタリン点眼用0.005%)

	現 行 品	変 更 後
内 箱	<div data-bbox="263 302 510 974"> <p>カタリン点眼用0.005%</p> <p>錠剤を溶解するまでの使用期限</p> <p>製造番号 錠剤</p> <p>製造番号 溶解液</p> <ul style="list-style-type: none"> ●錠剤の溶かし方については添付の説明書をよくご覧ください。 ●溶解後は、遮光のため必ずこの箱に入れて、凍結を避けて冷所(1~15℃)に保存し、<u>3週間以内</u>にご使用ください。 </div> <div data-bbox="550 302 798 974"> <p>押してあける</p>  <p>キャップはしめたまま</p> <p>点眼される際のお願ひ</p> <p>冷所に保存していた点眼液を取り出した後すぐに点眼すると(特に残りの薬液が少ない場合)、容器の中の冷たい空気が手で温められて膨張し、薬液が連続して落ちる場合があります。</p> <p>点眼する前にしばらく容器を手で温めてから点眼すると、1滴ずつ点眼できます。</p> </div>	<div data-bbox="861 302 1109 974"> <p>カタリン点眼用0.005%</p> <p>使用期限(錠剤を溶解するまで*)</p> <p>製造番号 錠剤</p> <p>製造番号 溶解液</p> <p>※錠剤溶解後は<u>3週間以内</u>にご使用ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●錠剤の溶解方法については添付の説明書をよくご覧ください。 ●溶解後は、遮光のため必ずこの箱に入れて、凍結を避けて冷所(1~15℃)に保存し、<u>3週間以内</u>にご使用ください。 </div> <div data-bbox="1157 302 1404 974"> <p>押してあける</p>  <p>キャップはしめたまま</p> <p>点眼される際のお願ひ</p> <p>点眼する前に、しばらく容器を手で温めてから点眼してください。</p> <p>《冷所保存していた点眼液をすぐに点眼しようとすると(特に薬液が少ない場合)、容器の中の冷たい空気が温められて膨張し、液が連続して落ちる場合があります。》</p> </div>

内箱表示(カタリンK点眼用0.005%)

	現 行 品	変 更 後
内 箱	<div data-bbox="263 1310 510 1982"> <p>カタリンK点眼用0.005%</p> <p>顆粒を溶解するまでの使用期限</p> <p>製造番号 顆粒</p> <p>製造番号 溶解液</p> <ul style="list-style-type: none"> ●顆粒の溶かし方については添付の説明書をよくご覧ください。 ●溶解後は、遮光のため必ずこの箱に入れて、凍結を避けて冷所(1~15℃)に保存し、<u>3週間以内</u>にご使用ください。 </div> <div data-bbox="550 1310 798 1982"> <p>押してあける</p>  <p>キャップはしめたまま</p> <p>点眼される際のお願ひ</p> <p>冷所に保存していた点眼液を取り出した後すぐに点眼すると(特に残りの薬液が少ない場合)、容器の中の冷たい空気が手で温められて膨張し、薬液が連続して落ちる場合があります。</p> <p>点眼する前にしばらく容器を手で温めてから点眼すると、1滴ずつ点眼できます。</p> </div>	<div data-bbox="861 1310 1109 1982"> <p>カタリンK点眼用0.005%</p> <p>使用期限(顆粒を溶解するまで*)</p> <p>製造番号 顆粒</p> <p>製造番号 溶解液</p> <p>※顆粒溶解後は<u>3週間以内</u>にご使用ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●顆粒の溶解方法については添付の説明書をよくご覧ください。 ●溶解後は、遮光のため必ずこの箱に入れて、凍結を避けて冷所(1~15℃)に保存し、<u>3週間以内</u>にご使用ください。 </div> <div data-bbox="1157 1310 1404 1982"> <p>押してあける</p>  <p>キャップはしめたまま</p> <p>点眼される際のお願ひ</p> <p>点眼する前に、しばらく容器を手で温めてから点眼してください。</p> <p>《冷所保存していた点眼液をすぐに点眼しようとすると(特に薬液が少ない場合)、容器の中の冷たい空気が温められて膨張し、液が連続して落ちる場合があります。》</p> </div>