

2016年10月

カタリン®点眼用0.005% カタリンK®点眼用0.005% 表示変更について

謹啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は、弊社製品につきまして格別のご高配を賜り誠に有難く厚くお礼申し上げます。
このたび老人性白内障治療剤「カタリン点眼用0.005%」および「カタリンK点眼用0.005%」
につきまして、以下のとおり表示の変更を行いますので、謹んでご案内申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

謹白

変更内容

[内箱]

使用期限表示面に調剤包装単位用コード（GS1 DataBar）を表示し、レイアウトを変更しました。

※統一商品コードおよび薬価基準収載医薬品コードは変更ありません。

(裏面もご参照ください)

変更表示



個装箱蓋部および使用期限表示面に「表示変更品」を表示します。

対象製品・製造番号・出荷予定時期



製品名	包装	製造番号	出荷予定時期
カタリン点眼用0.005%	15mL×10	錠剤：未定 溶解液：未定	未定
	15mL×50	錠剤：K124 溶解液：K124	2016年12月
カタリンK点眼用0.005%	15mL×10	顆粒：K532 溶解液：K523	2016年9月
	15mL×50	顆粒：K534 溶解液：K525	2016年11月

* 流通在庫状況により出荷時期に若干の差異を生じることがあります。

内箱 (カタリン点眼用0.005%)

現行品	変更品
 <p>カタリン点眼用0.005%</p> <p>使用期限(錠剤を溶解するまで*) (年/月) 2019/01</p> <p>製造番号 錠剤 K122</p> <p>製造番号 溶解液 K122</p> <p>※錠剤溶解後は3週間以内にご使用ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●錠剤の溶解方法については添付の説明書をよくご覧ください。 ●溶解後は、遮光のため必ずこの箱に入れて、凍結を避けて冷所(1~15℃)に保存し、3週間以内にご使用ください。 	 <p>カタリン点眼用0.005%</p> <p>使用期限(錠剤を溶解するまで*) (年/月) 2019/04</p> <p>製造番号 錠剤 K124</p> <p>製造番号 溶解液 K124</p> <p>※錠剤溶解後は3週間以内にご使用ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●錠剤の溶解方法については添付の説明書をよくご覧ください。 ●溶解後は、遮光のため必ずこの箱に入れて、凍結を避けて冷所(1~15℃)に保存し、3週間以内にご使用ください。 <p>調剤包装単位用コード 01)04987123505826</p>

内箱 (カタリンK点眼用0.005%)

現行品	変更品
 <p>カタリンK点眼用0.005%</p> <p>使用期限(顆粒を溶解するまで*) (年/月) 2019/02</p> <p>製造番号 顆粒 K530</p> <p>製造番号 溶解液 K521</p> <p>※顆粒溶解後は3週間以内にご使用ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●顆粒の溶解方法については添付の説明書をよくご覧ください。 ●溶解後は、遮光のため必ずこの箱に入れて、凍結を避けて冷所(1~15℃)に保存し、3週間以内にご使用ください。 	 <p>カタリンK点眼用0.005%</p> <p>使用期限(顆粒を溶解するまで*) (年/月) 2019/04</p> <p>製造番号 顆粒 K532</p> <p>製造番号 溶解液 K523</p> <p>※顆粒溶解後は3週間以内にご使用ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●顆粒の溶解方法については添付の説明書をよくご覧ください。 ●溶解後は、遮光のため必ずこの箱に入れて、凍結を避けて冷所(1~15℃)に保存し、3週間以内にご使用ください。 <p>調剤包装単位用コード 01)04987123505833</p>