

使用にあたっての注意

- ◆ 点眼によって、充血・しみる・かゆい・痛い・まぶたのくぼみ・黒目(虹彩)の色が濃くなるなどの症状があらわれることがあります。このような症状に気づいたら、すぐに医師または薬剤師にご相談ください。
- ◆ このお薬は、自己判断で使用を中止したり、使用量を加減したりすると病気が悪化することがあります。指示どおりに使い続けることが重要です。
- ◆ 点眼後に一時的に目がかすむことがあります。このような場合には機械類の操作や自動車等の運転は控え、症状が回復してから行うようにしてください。
- ◆ その他、点眼後に異常を感じた際には、すぐに医師または薬剤師にご相談ください。

ラタノプロスト点眼液 0.005%「センジュ[®]」を 使用される患者さまへ



この点眼液は、
緑内障・高眼圧症を治療するお薬です。

5mL用容器に2.5mLの液が入っていますので、お薬の量が少なく見えます。

点眼時の注意

◆ この点眼液は1回1滴、1日1回の点眼です。1日1回を超えて使用しないでください。



◆ 点眼後はしばらく目を閉じるか、目頭を指先で軽く押さえましょう(1~5分間)。

◆ 他の点眼液も使用している場合には、少なくとも5分間以上の間隔をあけてから点眼してください。

◆ コンタクトレンズを使用している場合にはレンズを外してから点眼し、15分以上経過してからレンズをつけてください。

保管上の注意

◆ キャップをしっかりと閉めてください。

◆ 開栓前は、冷蔵庫(2~8°C)で保管してください。

◆ 開栓後は、室温(1~30°C)で保管してください。冷蔵庫でも保管できますが、点眼液を冷蔵庫から取り出した後すぐに点眼すると、容器の中の冷たい空気が手で温められて膨張し、薬液が連続して落ちる場合があります。開栓後、冷蔵庫で保管する場合には、点眼する前にしばらく容器を手で温めてから点眼してください。

点眼後の注意

◆ 目の縁や皮膚についた余分な薬液は、すぐに濡らしたガーゼやティッシュペーパーなどでふき取るか、目を閉じて洗顔してください。



► 点眼後に目の縁や皮膚に薬液がついたままにしておくと、少しづつ目のまわりが黒ずんだり、まつ毛が長くなったり、太くなることがあります。

◆ 開栓後4週間経過した場合は、残液を使用しないでください。

◆ 高温や直射日光を避けて保管してください。