

使用にあたっての注意

- 点眼によって、充血・しみる・かゆい・痛い・息切れ・脈が減るなどの症状があらわれることがあります。このような症状に気づいたら、すぐに医師または薬剤師にご相談ください。
- このお薬は、自己判断で使用を中止したり、使用量を加減したりすると病気が悪化することがあります。指示どおりに使用し続けることが重要です。
- 点眼後に一時的に目がかすむことがあります。このような場合には機械類の操作や自動車等の運転は控え、症状が回復してから行うようにしてください。
- その他、点眼後に異常を感じた際には、すぐに医師または薬剤師にご相談ください。

千寿製薬株式会社

ラタチモ[®] 配合点眼液
「センジュ」[®]を
使用される患者さまへ



この点眼液は、緑内障・高眼圧症を治療するお薬です。

5mL用容器に2.5mLの液が入っていますので、お薬の量が少なく見えます。

点眼時の注意

- この点眼液は1回1滴、1日1回の点眼です。1日1回を超えて使用しないでください。
- 点眼直後にまばたきをしないでください。
- 他の点眼液も使用している場合には、5分以上の間隔をあけてから点眼してください。
- コンタクトレンズを使用している場合にはレンズを外してから点眼し、15分以上経過してからレンズをつけてください。



点眼後の注意

- 点眼後に目からあふれた点眼液を皮膚についたままにしておくと、少しずつ目のまわりが黒ずんだり、まつ毛が長くなったり、太くなることがありますので、次の点に注意してください。

目からあふれた点眼液は、すぐに濡らしたガーゼやティッシュなどでよくふき取るか、目を閉じて洗顔してください。



保管上の注意

- キャップはしっかりと閉めてください。
- 開封前は、冷蔵庫（2～8℃）に保存してください。
- 開封後は、遮光袋に入れて、室温（1～30℃）に保存してください。（冷蔵庫でも保存できます）
- 開封後4週間経過した残液は使用しないでください。
- 高温や直射日光を避けてください。