

使用に際して、この説明文書を必ず読むこと。また、必要なときに読めるように大切に保管すること。

人工涙液

コンタクトの腫がひんやりうるおう

New **マイティア**® **CLクール**

第3類医薬品

販売名 NewマイティアCLクール-s

特 徴

- すべてのコンタクトレンズ(ハード・ソフト)を装着したまま使用いただけます。
- コンタクトレンズを装着されていない方も使用いただけます。
- イオンバランスを正常な涙に近づける塩化カリウム・塩化ナトリウム、目の新陳代謝を促進するブドウ糖、角膜の修復などを助けるタウリンを配合した目薬です。
- 目のかゆき・疲れに効果をあらわします。
- わずかに粘性がある、ひんやり冷たいソフトなクール感の目薬です。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (3) 次の症状のある人。
はげしい目の痛み
 - (4) 次の診断を受けた人。
緑内障
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

| 関係部位 | 症 状 |
|------|---------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 目 | 充血、かゆみ、はれ、刺激感 |

3. 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
 - (1) 目のかすみが改善されない場合。
 - (2) ハードコンタクトレンズ装着の人で、目やになどの分泌物が多く、レンズがくもった場合。
 - (3) 2週間位使用しても症状がよくなる場合。

効 能

ソフトコンタクトレンズまたはハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、涙液の補助(目のかわき)、目の疲れ、目のかすみ(目やにの多いときなど)

用法・用量

1回2～3滴を1日5～6回点眼してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (2)容器の先を目、まぶた、まつ毛に触れさせないこと(目やにやその他異物等が混入することで、薬液が汚染あるいは混濁することがある。)。また、混濁したものは使用しないこと。
- (3)点眼用のみ使用すること。
- (4)用法・用量を厳守すること。



容器の先が目、まぶた、まつ毛にふれないように


成 分 1 mL中

| 成 分 | 含 量 |
|---------|--------|
| 塩化ナトリウム | 5.5mg |
| 塩化カリウム | 1.5mg |
| ブドウ糖 | 0.05mg |
| タウリン | 1mg |

添加物：ホウ酸、ホウ砂、ヒプロメロース、エデト酸ナトリウム水和物、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油60、アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩、*l*-メントール、pH調節剤

保管および取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。特に自動車内や暖房器具の近くなど、高温となるおそれのある場所に放置しないこと。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)容器に他のものを入れて使用しないこと。
- (5)他の人と共用しないこと。
- (6)使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。
また、使用期限内であっても、内袋開封後はすみやかに使用すること。
- (7)保存の状態によっては、容器の先周囲やキャップの内側に薬液中の成分の結晶が付くことがある。このような場合には清潔なガーゼで軽くふき取って使用すること。



容 量 15mL

本品についてのお問合せは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。
千寿製薬株式会社「お客様インフォメーション」
〒541-0048 大阪市中央区瓦町三丁目1番9号
電話 0120-078-552 受付時間：9:00～17:30(土、日、祝日を除く)