


ブリンゾラミド懸濁性
点眼液 1%「センジュ」[®]を
使用される患者さまへ




この点眼液は、緑内障・高眼圧症を治療するお薬です。

点眼時の注意

- この点眼液はキャップを閉じたまま、よく振ってからお使いください。



- この点眼液は1回1滴、1日2回の点眼です。(医師の判断によって、1回1滴、1日3回の点眼になる場合があります。医師の指示通りに点眼してください。)



- 点眼の際、容器の先端が眼やまわりにふれないように注意してください。



点眼時の注意

- 他の点眼液も使用している場合には、10分以上の間隔をあけてから点眼してください。



- コンタクトレンズを使用している場合にはレンズを外してから点眼し、15分以上経過してからレンズをつけてください。



保管上の注意

- 乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光を避け、室温（1～30℃）で保管してください。

使用にあたっての注意

- 点眼によって、充血・しみる・かゆい・痛い・かすむなどの症状があらわれることがあります。このような症状に気づいたら、すぐに医師または薬剤師にご相談ください。
- このお薬は、自己判断で使用を中止したり、使用量を加減したりすると病気が悪化することがあります。指示どおりに使用し続けることが重要です。
- 点眼後に一時的に目がかすむことがあります。このような場合には機械類の操作や自動車の運転には注意してください。
- その他、点眼後に異常を感じた際には、すぐに医師または薬剤師にご相談ください。