

オロパタジン 点眼液 0.1%「センジュ®」を 使用される患者様へ

この点眼液は、アレルギー性結膜炎を治療するお薬です。

紫色のキャップ

無色～微黄色澄明の
点眼液

1回 1～2滴、

1日 4回

(朝、昼、夕方、就寝前)
点眼してください。



手に取りやすい
平らな形状の容器

使用にあたっての注意

・点眼によって、目に以下のような症状があらわれることがあります。
このような症状に気づいたら、すぐに医師または薬剤師にご相談ください。

目の痛み、しみる、目のまわりの炎症、目のゴロゴロ感、目のかゆみ

・その他、点眼後に異常を感じた際には、すぐに医師または薬剤師にご相談ください。

点眼時の注意

- ・点眼の際に、点眼容器の先が目やまぶた、まつ毛にふれないようにして、できるだけ容器を真下に向けて点眼してください。
- ・目の縁や皮膚についた余分な薬液は、すぐに清潔なガーゼやティッシュペーパーなどでふき取ってください。
- ・他の点眼液を使用する場合には、少なくとも5分間以上の間隔をあけて点眼してください。
- ・コンタクトレンズを使用している場合にはレンズを外してから点眼し、10分以上経過してからレンズをつけてください。

保管上の注意

- ・点眼容器の先に薬液が付着した場合には、清潔なガーゼやティッシュペーパーなどでふき取ってください。
- ・キャップをしっかりと閉めてください。
- ・添付の遮光袋に入れて、室温（1～30℃）で保管してください。
- ・高温や直射日光を避けてください。
- ・開栓した点眼液は1ヵ月以内を目安に使用してください。