


アジマイシン点眼液 1%を 使用される患者様へ



監修：鳥取大学名誉教授 / 日野病院 井上 幸次 先生

アジマイシン点眼液1%は細菌による眼の感染症を治療するお薬です。
点眼日数が決められており、疾患によって点眼日数が異なります。

1日1回の点眼です。
ただし、
最初の2日間のみ**1日2回**の点眼です。



医師の指示に従って点眼しましょう。

アジマイシン点眼液1%の使い方

〈結膜炎〉

通常、成人及び7歳以上の小児には、1回1滴、最初の2日間は1日2回、その後の5日間は1日1回点眼です。

〈眼瞼炎、麦粒腫、涙囊炎〉

通常、成人には、1回1滴、最初の2日間は1日2回、その後の12日間は1日1回点眼です。

感染症をきちんと治すために

感染症の治療には細菌を退治する抗菌薬が使われます。抗菌薬の種類と使い方は、感染症の原因となる細菌によって決められます。医師から指示された使い方を守り、自分の判断で使い方を変えないよう、以下のことに注意しましょう。

1 指示された1回の量や1日の使用回数よりも多く使用しない。

➔ たくさん使っても感染症が早く治るわけではありません。


2 指示された使用期間を超えて使用しない。

➔ 抗菌薬の効きにくい細菌（耐性菌）が出てくる可能性があります。



3 治療途中で抗菌薬の使用を中止しない。

➔ 症状が軽くなり、治ったと思っても細菌が残っていて、症状が再び現れることがあります。



● 感染症が完治したかどうか、正確に判断するには医師の診断が必要になります。医師から再度受診の必要があるといわれた場合は忘れずに診察を受けましょう。

