for Animal Use

PAPITEIN®

# ワンちゃんの角膜障害に…

## パピテイン®を使用される飼い主さまへ

このお薬は角膜障害に使う目薬です。
傷のある角膜は、細菌や角膜から産生されるコラゲナーゼ(タンパク質分解酵素)によって障害がひどくなります。
パピテイン®はコラゲナーゼの働きを抑えて、創傷性角膜炎や角膜潰瘍の悪化を防ぎます。


創傷性角膜炎


角膜潰瘍

獣医師の指示により
正しくお使いください。

- この目薬は流通期間中の安定性を保つため脱酸素剤（エージレス）を含むアルミ袋に入っていますが、開封後は不必要です。

- 使用期限内であっても、栓を開けたらすみやかにお使いください。

- 保管の際には、高温を避け、室温（1～30℃）で保存してください。



- 他の容器に入れかえて使わないでください。

- 空のパピテイン®容器に他のものを入れないでください。

- しみるなどの異常があった時には獣医師にご相談ください。
- 点眼用にのみお使いください。
- 他のワンちゃんには使用しないでください。

# 目薬のさし方

## 1

あごの下に片方の手を添えて、
顔を真上に向け、
親指と人差し指で目薬を持ち、
残りの指でまぶたを開きます。

## 2

目薬の容器がワンちゃんの
視界に入らないように
後ろからさします。

## 3

容器の先端が目に
触れないように
注意してください。



## 4

目から目薬がこぼれたら
拭き取ってください。

## 5

数種類の目薬をさす時は、
間隔を5分以上あけてください。

製造販売元 千寿製薬株式会社　販売 DSファーマアニマルヘルス株式会社
2052AH　2018年2月作成

for Animal Use

PAPITEIN®

# ネコちゃんの角膜障害に…

## パピテイン®を使用される飼い主さまへ

このお薬は角膜障害に使う目薬です。
傷のある角膜は、細菌や角膜から産生されるコラゲナーゼ(タンパク質分解酵素)によって障害がひどくなります。
パピテイン®はコラゲナーゼの働きを抑えて、創傷性角膜炎や角膜潰瘍の悪化を防ぎます。


創傷性角膜炎


角膜潰瘍

獣医師の指示により
正しくお使いください。

- この目薬は流通期間中の安定性を保つため脱酸素剤（エージレス）を含むアルミ袋に入っていますが、開封後は不必要です。

- 使用期限内であっても、栓を開けたらすみやかにお使いください。

- 保管の際には、高温を避け、室温（1～30℃）で保存してください。



- 他の容器に入れかえて使わないでください。

- 空のパピテイン®容器に他のものを入れないでください。

- しみるなどの異常があった時には獣医師にご相談ください。
- 点眼用にのみお使いください。
- 他のネコちゃんには使用しないでください。

# 目薬のさし方

## 1

あごの下に片方の手を添えて
真上に向かせます。
もう一方の手でまぶたが上を向くように頭をしっかり固定します。

## 2

目薬の容器がネコちゃんの
視界に入らないように
なるべく後ろから目の上に
点眼します。

## 3

容器の先端が目に触れないように
注意してください。



## 4

目から目薬がこぼれたら
拭き取ってください。

## 5

数種類の目薬をさす時は、
間隔を5分以上あけてください。

製造販売元 千寿製薬株式会社　販売 DSファーマアニマルヘルス株式会社
2052AH　2018年2月作成