



【成分・分量】100mL中サリチル酸:0.05g含有(添加物としてイソプロパノール:5mL他含有)

【効能・効果】犬:耳内の洗浄及び殺菌消臭

【用法・用量】1日1回、処置する耳を上にして、充分量(2~5mL)を犬の耳内に投与し、耳根部を10~20秒間やさしくマッサージする。本剤を耳内表面に十分行きわたらせた後、耳内の本剤や汚れを脱脂綿等で拭き取る。

製造番号、使用期限は底面表示

製造販売元 千寿製薬株式会社  
大阪市中央区瓦町三丁目1番9号

お問合せ先 TEL:0120-078-552

販 売 物産アニマルヘルス株式会社  
大阪市中央区本町2-5-7



キャップ:PP  
ボトル:PP  
中栓:PE

【一般的注意】(1)本剤は効能・効果において定められた目的にのみ使用すること。(2)本剤は定められた用法・用量を厳守すること。(3)本剤は獣医師の指導の下で使用すること。

【使用者に対する注意】(1)本剤が眼に入らないように注意すること。万一、使用者の眼に入った場合は、こすらずに直ちに流水で洗眼し、本品を持参して速やかに医師の処置を受けること。(2)本剤が皮膚につかないよう注意すること。万一、使用者の皮膚についていた場合は、直ちに水で洗い流すこと。(3)本剤を誤飲しないように注意すること。万一、誤飲した場合は、本品を持参して速やかに医師の処置を受けること。

【犬に対する注意】

1.制限事項:鼓膜に損傷のある耳には使用しないこと。  
2.副作用:本剤の使用により、発疹等の過敏反応が現れた場合には、使用を中止し、速やかに獣医師の診察を受けること。  
3.適用上の注意:(1)本剤は耳の洗浄のみに使用すること。(2)本剤が犬の眼や口に入らないように注意すること。眼や口に入った場合には、速やかに獣医師の診察を受けること。(3)容器の汚染を防ぎ、また、患部を傷つけないよう、容器の先端を患部に触れさせないようにすること。(4)脱脂綿等で耳内の本剤と汚れを拭き取る際は、耳内を傷つけないよう注意すること。

【取扱い上の注意】開封後は、なるべく早く使い切ること。

【保管上の注意】(1)小児の手の届かないところに保管すること。(2)本剤は直射日光及び高温を避け、密栓して保管すること。(3)誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと。



【成分・分量】100mL中サリチル酸:0.05g含有(添加物としてグリセリン:2g他含有)

【効能・効果】犬:耳内の洗浄及び殺菌消臭

【用法・用量】1日1回、処置する耳を上にして、充分量(2~5mL)を犬の耳内に投与し、耳根部を10~20秒間やさしくマッサージする。本剤を耳内表面に十分行きわたらせた後、耳内の本剤や汚れを脱脂綿等で拭き取る。

製造番号、使用期限は底面表示

製造販売元 千寿製薬株式会社  
大阪市中央区瓦町三丁目1番9号

お問合せ先 TEL:0120-078-552

販 売 物産アニマルヘルス株式会社  
大阪市中央区本町2-5-7



キャップ:PP  
ボトル:PP  
中栓:PE

【一般的注意】(1)本剤は効能・効果において定められた目的にのみ使用すること。(2)本剤は定められた用法・用量を厳守すること。(3)本剤は獣医師の指導の下で使用すること。

【使用者に対する注意】(1)本剤が眼に入らないように注意すること。万一、使用者の眼に入った場合は、こすらずに直ちに流水で洗眼し、本品を持参して速やかに医師の処置を受けること。(2)本剤が皮膚につかないよう注意すること。万一、使用者の皮膚についていた場合は、直ちに水で洗い流すこと。(3)本剤を誤飲しないように注意すること。万一、誤飲した場合は、本品を持参して速やかに医師の処置を受けること。

【犬に対する注意】

1.制限事項:鼓膜に損傷のある耳には使用しないこと。  
2.副作用:本剤の使用により、発疹等の過敏反応が現れた場合には、使用を中止し、速やかに獣医師の診察を受けること。  
3.適用上の注意:(1)本剤は耳の洗浄のみに使用すること。(2)本剤が犬の眼や口に入らないように注意すること。眼や口に入った場合には、速やかに獣医師の診察を受けること。(3)容器の汚染を防ぎ、また、患部を傷つけないよう、容器の先端を患部に触れさせないようにすること。(4)脱脂綿等で耳内の本剤と汚れを拭き取る際は、耳内を傷つけないよう注意すること。

【取扱い上の注意】開封後は、なるべく早く使い切ること。

【保管上の注意】(1)小児の手の届かないところに保管すること。(2)本剤は直射日光及び高温を避け、密栓して保管すること。(3)誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと。